

Marisques

Les marisques sont des boursouflures de peau bénignes qui se forment chez de nombreuses personnes âgées dans la région anale. Elles peuvent également apparaître après une thrombose veineuse anale (occlusion veineuse suite à la formation de caillots sanguins), des fissures anales (déchirures de la muqueuse), des inflammations ou, chez les femmes, après plusieurs grossesses. Les marisques constituent souvent un problème esthétique, mais également hygiénique. Elles peuvent causer des démangeaisons désagréables, des brûlures, des suintements et de petites pertes de sang (spotting).

Les marisques sont retirées chirurgicalement si la gêne, les problèmes d'hygiène ou les inflammations ne disparaissent pas ou s'ils réapparaissent fréquemment.

L'intervention est effectuée dans notre cabinet et dure entre 15 et 30 minutes.

Si nécessaire, un cathéter veineux est posé avant l'intervention pour pouvoir administrer un médicament anesthésique. La plupart du temps, une injection locale d'anesthésique est réalisée pour opérer la boursouffure cutanée au niveau de l'anus.

Les marisques sont enlevées chirurgicalement en utilisant un bistouri électrique ou le laser. Cette étape est généralement suivie d'un traitement de la plaie ouverte pour s'assurer que le liquide de la plaie puisse s'écouler librement. Les interventions chirurgicales sur les petites boursouflures cutanées dans la région anale sont **généralement sans complication**.

Pour le traitement post-intervention, des rinçages désinfectants et des pommades sont prescrits pendant une semaine en plus d'une bonne hygiène anale avec nettoyage humide.

© Gastroenterologische Praxis Balsiger, Seibold & Partner